



# NEVIKÉN®

## Extra

### ROVAR- ÉS GOMBAÖLŐ PERMETEZŐSZER EMULZIÓKÉPZŐ KONCENTRÁTUM (EC)

**Hatóanyag tartalom:** paraffinolaj 58 % (m/m)  
polisulfidkén 7 ± 0,5% (m/m)

**Forgalmazási kategória: III**

Gyártási idő, szám:  
Nettó tartalom:  
Engedély száma:

lásd a csomagoláson (év/hónap/nap)  
5 liter  
21294/1996 FVM

Felhasználás előtt olvassa el a használati utasítást  
és győződjön meg arról, hogy megértette.  
Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése  
érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait



Engedély tulajdonosa, gyártja, kizsereli és forgalomba hozza:

**CORAX-BIONER BIOTECHNOLÓGIAI ZRT.**

1119 Budapest, Etele út 57.

[www.corax-bioner.hu](http://www.corax-bioner.hu)

A készítmény felhasználására vonatkozó előírások		Kijuttatáshoz szükséges szer mennyisége (l/ha)	víz
Kultúra	Károsító		
almamészék (alma, körte, birs, napoly), csonthéjasok (cseresznye, meggy, kajabacsk, fűzöbacsok, zihla), szőlő (szőlő és tiszta lemosó permetezésre)	lisztharmat, pajzstetű, levélteli tigrisok, körte-levélbóka, kártékó atkák gyérítésére	25 - 50	1000 - 1200
szőlő	lisztharmat	0,5 - 1,0 %	600 - 1200
kálicsok (árpá, búza, rizs, zab, tritikale)	lisztharmat	1,0 - 2,0 %	250 - 300
alma	takacsatkák gyérítése vegetációban	0,5 - 1 %	600 - 800
fekete és piros ribizke, málna, köszméte, fekete bodza, josta	takacsatka, levéltetű, pajzstetű áttelőlé alakok ellen nyugalmi állapotban	2,0 - 3,0 %	600 - 900
szamóca	atkák, levéltetű, pajzstetű ellen vegetációban atkák, levéltetűk ellen vegetációban	0,5 - 1,0 % 0,5 - 1,0 %	600 - 900 400 - 500
szeder	szederatka áttelőlé alakok ellen vegetációban	2,0 - 3,0 % 0,5 - 1,0 %	600 - 900 600 - 900

#### Házi kerti felhasználás:

- 0,5 - 1,0 dl / 6 - 12 liter víz/100 m<sup>2</sup> (szőlő, almamészék, csonthéjas - vegetációban)
- 2,0 - 3,0 dl / 6 - 9 liter víz/100 m<sup>2</sup> (ribizske, málna, köszméte, szeder, fekete bodza, josta - áttelőlé alakok ellen)
- 0,5 - 1,0 dl / 10 liter víz + 4 - 5 liter/100 m<sup>2</sup> (szamóca - vegetációban)

## Előírt növényvédelmi technológia:

**Almában, szilvában, körteben** rugyattansózt a szőlőből álló 25-50 l/ha **őszibarackban, kajsziabarackban, cseresznyében, meggyben** rugyattansózt 25-50 l/ha, rugyattansózt zöldibolyból álló 25-30 l/ha mennyiségben **szőlőben** rugyattansózt 25-50 l/ha, rugyattansózt gyapottal álló 25-30 l/ha mennyiségben kell felhasználni. **Szőlőben** vegetációban a készítményt a fertőzésveszélyes időszakban preventív jelleggel, legkésőbb az első tünetek megjelenésekor kell kijuttatni, és a fertőzés veszélytől függően 7-12 napos időközönként szükség szerint (legfeljebb 5 alkalommal) célszerű megismételni. Melegebb/forróbb időjárásnál az alacsonyabb dózis használata ajánlott. Súlyos fertőzésveszély fennállásakor a növényből (7-10 nap) permetező forduló és a magasabb koncentráció alkalmazása ajánlott. A permetézéses permetet a lombhoz nagyságától függően kell megadástani, mert minden esetben törekedni kell az egyenletes- és teljes megfűződésére, még a lombhoz belsejében is. **Kálicsokban** lisztharmat ellen a fertőzés veszélytől függően, 1-3 alkalommal, szárbandulástól virágzóig szerinti védekezést, 10-20 naponként. **Almában** a készítményt a felszaporodó takacsatkák gyérítésére a tavaszi időszakban 7-10 naponként, 2-3 alkalommal megismételve célszerű alkalmazni. A készítménynek almafa-lisztharmat ellen kedvező mellékhatása van. **Ribizske, málna, köszméte, szeder, fekete bodza, josta** kultúrákban takacsatkák, levéltetvek, pajzstetvek, szederatka áttelőlé alakjai ellen a védekezést őszi lombhullás előtt, tavasszal rugyattansóztól kezdve kell elvégezni nagy permetésmennyiséggel lemosászerűen (ribizske, málna, köszméte, josta 600-800 l/ha; szeder, fekete bodza: 800-900 l/ha víz). Vegetációban, állományegészségnél, takacsatkák, levéltetvek, pajzstetvek károsító alakjainak gyérítésére, 7-10 naponként 2-3 alkalommal megismételve célszerű alkalmazni. Az alkalmazandó koncentrációt az áttelőlé alakok egyedszámától, illetve vegetációban a fertőzés erősségétől függően célszerű kiválasztani. **Szederben** szederatka gyérítés céljából rugyattansóskor 3,0%-os, bimbós állapotban és virágzó kateden 1,0%-os koncentrációban javasolt kijuttatni. A védekezéseket rugyattansóskor az áttelőlé növények és az általuk lerakott tojások ellen, illetve a kártékó mirigáslásnak időszakban, bimbós állapotban és a virágzó kateden kell elvégezni addig amíg a mirigó egyedek a vaxokcióban meg nem telepednek. **Szamócaban** atkák, levéltetvek ellen tenyészidőszakban szükség szerinti ismétléses teljes borítást biztosítópertmetéssel kell kijuttatni. A készítmény beleszórható a bogysó gyümölcsök kultúrák környezetkímélő biogazdálkodási technológiájába.

A készítmény fagymentes időszakban kell kijuttatni. A szer hatását rontja a túl korai kijuttatás, amikor a körkocok fejlődése és a károsítók mozgása még nem indult meg, valamint a kezelés utáni túl nagy mennyiségű csapadék, amely a szer lemoshatja. A permetezés elvégzése a nyári időszakban a korai hajnal, vagy a késő esti órákban szükséges minden esetben 25°C alatti hőmérséklet viszonyoknál. 25°C feletti alkalmazása perzselési veszélyt jelöl.

A bekvett permetelvet az elkészítés napján fel kell használni.

**Légi kijuttatás:** nem engedélyezett.

## Gyártói ajánlás:

Légző kórokozók és poliszulfidra érzékeny növényvédő szerekkel nem keverhető. Réztartalmú növényvédő szerekkel előzetes próba elvégzése javasolt. A készítmény a réz és alumíniumtartalmú eszközök károsíthatja. Bőrgyógy, súlyos nyálkahártya károsító, illetve allergizáló hatása lehet. A felbonrtított gőnyöleg tartalmát lehetőleg maradtalanul fel kell használni. Kombinációs partner talajba való bekeverését megelőzően, a változó körülmények miatt minden esetben célszerű előzetes keverési próbát elvégezni. Oldatokban tartalmú termékeknek nem keverhetőek magas nitrogén tartalmú műtrágyákkal, sem réztartalmú lombtrágyákkal továbbá nedvesítőszerek adalék hozzáadása sem javasolt.

## Felhasználás előtt felrészandó!

## A készítmény eltarthatósága:

Fredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos fagymentes növényvédő szer rakárban 2 év.

## Előkészítőknél és felhasználóknál:

A készítmény emberre, állatra, környezetre való veszélyessége és a biztonságos felhasználásának előírása:

Vízi szervezetekre való veszélyessége: nem jelölésköteles

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles

Tűzveszélyesség besorolás: nem jelölésköteles

A készítmény p.o.LD<sub>50</sub> értéke (patkányon): >3869 mg/tkg

Figyelmeztetés: **Veszély**

H304 Lenyelve és léguatka kerülve halálos lehet.

H319 Súlyos szemirritációt okoz.

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.

P280 Védőkesztyű/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vizel.

Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható.

Az öblítés folytatása.

LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon a TOXIKOLÓGIAI

KÖZPONTHOZ/ orvoshoz.

P301 + P310

P331 TILOS hánytatni.

P405 Elzárva tárolandó.

P501

A tartalom/edény elhelyezése hulladékmentes:

veszélyes hulladéklerakókba szállítás szükséges.

Savval érintkezve mérgező gázok képződnek.

A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével

ne szennyezze a vizeket!

(A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében!

Kerülje a gázcsapásban vagy az utakon levő vízvezetőkön keresztül való szennyeződést.)

SPe 3

A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m távolságra tartson meg egy kezzeletlen, növényzettel borított (lehetőleg zárt gyp) biztonsági övezetet!

## Egyéb környezetvédelmi előírások:

Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

**Munkaegészségügyi várakozási idő:** 0 nap;

**Élelmezés - egészségügyi várakozási idő:** Az engedélyezett kultúrákban előírás szerinti felhasználás esetén korlátozás nincs;

**Munkaegészségügyi övrendszabályok:** egyéni védőfelszerelés - előkészítőknél és

kijuttatóknál: védőruh, védőkesztyű, sav elleni védőszemüveg, védőálbél.

**Elősegélynyújtás, terápia:** Mérgezőskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy

annak gyanújkor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás

után (lásd: lég- és ásványolaj mérgezés) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani. Tunét -

megfigyelő kezelést!

**Ellenanyag:** specifikus antitóduma nincs.

**Mérgezőskor, vagy annak gyanújkor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató**

**Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld számra: 06 80 201 199**

**A kiürült és tisztított csomagolóeszközök újrafelhasználása tilos!**

CESTEJ Nonprofit Kft. növényvédő szerrel szennyezett csomagolóanyag gyűjtőhelyeinek

listája megtalálható a <http://www.csebeur.com> címen

Tel.: +36 1 340 4888

