



corax - bioner
biotechnológia

VOLIGOP®

Magnézium

EK OLDAT MŰTRÁGYA

Gyártási idő, szám: lásd a csomagoláson (év/hónap/nap)

Nettó tartalom: lásd a csomagoláson

Statisztikai szám: 13301583-72-114-01

Engedély tulajdonosa, gyártja, kisereli és forgalomba hozza:

CORAX-BIONER BIOTECHNOLÓGIAI ZRT.

1119 Budapest, Etele út 57.

corax-bioner@t-online.hu

www.corax-bioner.hu



A VOLIGOP® Magnézium oldatműtrágya keverhetősége más termékekkel:
a permetlé elkészítése előtt **keverhetőségi próba elvégzése javasolt.**

**A kiürült és tisztított csomagolóeszközök
újra felhasználása tilos!**

Bejelentésszám NÉBIH: 04.2/11907-2/2014

VOLIGOP® Magnézium - Magnézium-nitrát oldat (C.1.4)

Hatóanyag	m/m %	m/v %	g/l
Nitrogén (N)	7,0	9,5	95
nitrát (N)	7,0	9,5	95
Magnézium (Mg)	6,0	8,1	81
Magnézium-oxid (MgO)	10,0	13,6	136

VOLIGOP® Magnézium vízoldható, a növények leveleiken és/vagy gyökerein át is felveszik. Így a levéltrágyázás és/vagy tápoldatos öntözés formájában egyaránt kijuttatható!

Felhasználható:

Levéltrágyázással:

- Gyümölcsösökben, almában 1 - 1,5 %-os töménységben a vegetációs időszak elejétől (lombosodástól) mintegy 3-4 alkalommal, 10-14 naponkénti gyakorisággal.
- Szőlőben terméskötődéstől (apróbogyós állapottól) kezdődően – zsendülésig (érésig) 0,5 - 1,5 % töménységben, 10-14 naponkénti gyakorisággal, mintegy 4 alkalommal a kocsány bénulás megakadályozására.
- Kabakosokban (dinnye, uborka) terméskötődéskor 0,5 % töménységben, ezt követően 10-14 naponkénti gyakorisággal megismételni 1-2 alkalommal.
- Paradicsomban, paprikában 0,5 - 1,2 %-os töménységben ezt követően 10-14 naponkénti gyakorisággal megismételni 1-3 alkalommal.

Szántóföldön:

- Búzában 0,3% töménységben szárba induláskor (nódusz képződésekor), majd zászlóslevél megjelenésekor ismételtkijuttatást javasolunk.
- Kukoricában 0,3% töménységben virágzás kezdetekor (címerhányáskor), majd 10-14 nap múlva ismételt kijuttatást javasolunk.
- Burgonyában 0,5 % töménységben – virágzás kezdetekor (virágbimbók megjelenésekor).

Tápoldatos öntözéssel: a növények magnézium igénye a hajtásban sokkal magasabb az átlagostól, ezért célszerű a magnéziumot tápoldattal is pótolni, a növényeink számára biztosítani, 0,5-1,5 % töménységben.

A készítmény eltarthatósága:

Eredeti zárt csomagolásban, fedett, száraz, hűvös, **szigorúan fagymentes** helyen **2 év**.